



R O M Â N I A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

910058; Călărași, str. București, nr. 140A; Tel.: 0242-31.10.05, Fax: 0242/31.85.74
web: www.primariacalarasi.ro ; email: office@primariacalarasi.ro



27 Februarie 2026

Tratamente de deratizare: 2 – 4 martie 2026

Primăria Municipiului Călărași informează că în perioada 2 – 4 martie 2026, în intervalele orare 08.00 – 12.00 și 13.00 – 17.00, pe raza municipiului Călărași, se vor executa tratamente de deratizare în vederea eliminării populației de rozătoare de pe domeniul public.

Tratamentele se vor aplica doar când condițiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt PROKUM G (substanță activă brodifacoum 0,0025%), PRODORAT G (substanță activă bromadiolone 0,005%), NOCURAT PASTA (substanță activă difenacoum 0,005%).

Produsele menționate care se regăsesc în Registrul produselor biocide plasate în piață în baza acordării certificatelor de recunoaștere mutuală, sunt autorizate pentru profilaxia sanitar – umană și vor fi utilizate în continuare în conformitate cu indicațiile stipulate în documentația aprobată de Comisia Națională pentru produsele biocide din cadrul Ministerului Sănătății.

RECOMANDĂRI POPULAȚIE

1. Evitați să circulați în preajma locației unde se face tratament în perioada de timp și în intervalul orar menționat mai sus.
2. Nu atingeți echipamentele montate pentru combaterea rozătoarelor (stații de intoxicare alimentate cu momeală raticidă).
3. Nu atingeți carcasele de rozătoare, în măsura în care acestea au fost identificate, în timpul tratamentului. Se va anunța prestatorul pentru colectarea acestora.
4. În caz de urgență, dacă un animal nonvizat sau o persoană are acces și a consumat momeala raticidă se va anunța prestatorul și se vor aplica măsurile de prim ajutor menționate.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE CONTACT ACCIDENTAL

1. Rodenticidele anticoagulante inhibă vitamina K din organism și blochează formarea protrombinei.
2. Dacă este înghițită momeala raticidă, simptomele pot fi întârziate, pot include sângerarea nasului și a gingiilor, în cazuri severe pot apărea echimoze și sânge în scaun sau urină.
3. În caz de ingerări în cantități mari de produs, antidotul îl reprezintă vitaminele K și K1. Medicamentul se va administra intravenal numai dacă apar alternări ale activității protrombinice și nu preventiv, sub supraveghere medicală.
4. În caz de contact cu pielea, spălați imediat zona afectată cu multă apă și săpun. Nu are efecte iritante.