




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI PENTRU ȘIGURANȚA ALIMENTELOR**



ATENȚIE!

PESTA RUMEGĂȚOARELOR MICI



**Boală virală gravă foarte contagioasă care afectează
ovinele și caprinele.**

**Se manifestă prin febră, tulburări digestive și respiratorii,
necroze, eroziuni și ulcere la nivelul căilor respiratorii.**

Nu prezintă risc pentru om !

**ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ TREBUIE ANUNȚATĂ
IMEDIAT MEDICULUI VETERINAR DIN LOCALITATE
SAU D.S.V.S.A. JUDEȚEANĂ**

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

În Bulgaria evoluează PESTA MICILOR RUMEGĂTOARE.

PROTEJAȚI – VĂ ANIMALELE !

Speciile afectate sunt ovinele și caprinele

Cazurile mai grave apar la caprine, animalele tinere, hrănite deficitar, parazitare

Iezii cu vârsta peste 4 luni și sub 1 an sunt cei mai sensibili

Semne : febră, slăbire accentuată, scurgeri oculare și nazale, leziuni necrotice în cavitatea


bucală ; după 3-4 zile apare diareea cu sânge; tuse

Moartea apare la 7 zile de la debutul bolii

Leziuni necrotice la nivelul

Ochi și nas cu secreții purulente

gurii



Nu există tratament !

Boala nu afectează omul

Examinați turmele de oi și capre și anunțați în regim de urgență medicul veterinar din localitatea dumneavoastră sau D.S.V.S.A. Călărași la numărul de telefon 0242313676 asupra oricăror modificări apărute în starea de sănătate a animalelor dumneavoastră

PESTA MICILOR RUMEGĂTOARE

Simptomele bolii

Pesta micilor rumegătoare (PMR) este o boală virală gravă, care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele și caprinele. Mortalitatea în cazul animalelor infectate poate ajunge la 70 %. În România nu evoluează această boală, țara noastră având statut de țară liberă de PMR.

PMR este caracterizată prin febră, scurgeri oculo-nazale, stomatită, diaree, pneumonie. Agentul etiologic este un virus încadrat în familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxovirinae, genul Morbillivirus.

Transmiterea infecției se face direct de la animalul bolnav la cel receptiv și puțin probabil indirect, având în vedere rezistența scăzută a virusului în mediul exterior. Virusul pătrunde în organism la nivelul mucoasei nasofaringiene.

Evoluția bolii este supraacută sau acută, caracterizată clinic prin febră, tulburări digestive și respiratorii, iar morfopatologic prin necroze, eroziuni și ulcere la nivelul mucoasei digestive și a căilor respiratorii. În Bulgaria evoluează forma ușoară, atipică.

Principalele măsuri de prevenire a bolii

- Achiziționarea de animale din speciile susceptibile (ovine, caprine) numai cu documente sanitar-veterinare;
- Să prenotifice DSVSA județeană orice achiziție de ovine sau caprine din zonele din Bulgaria neafectate de PMR;
- Obligația notificării medicului veterinar oricând observă modificări de comportament, îmbolnăviri sau moarte.

Măsuri în cazul apariției bolii

În caz de apariție a boli în țări indemne se aplică prevederile Directivei Consiliului 92/119/EEC de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice care cuprind printre altele: izolarea animalelor, stabilirea zonelor de protecție și supraveghere, restricții de mișcare a animalelor, stampig-out, operațiunile de curățare și dezinfecție. **Vaccinarea se aplică doar în situații grave, cu aprobarea CE.** Primul focar de PMR din UE a fost confirmat în Bulgaria, în data de 23 iunie a acestui an. A urmat confirmarea altor 6 noi focare în 28 iunie, 9 iulie și 18 iulie. Totodată au fost confirmate alte 94 animale seropozitive în zona de 20 km în jurul satelor afectate în baza supravegherii realizate de autoritățile veterinare bulgare.

DACĂ AVEȚI ORICE SUSPICIUNE, ANUNȚAȚI MEDICUL VETERINAR !